

# Atrypa

## Classificazione

<b>Dominio</b>	Eukaryota Woese e al. 1990
<b>Regno:</b>	Animalia Linnaeus, 1758
<b>Superphylum</b>	
<b>Phylum:</b>	Brachiopoda Lamarck, 1809
<b>Subphylum:</b>	Rhynchonelliformea
<b>Classe:</b>	Rhynchonellata
<b>Sottoclasse:</b>	
<b>Ordine:</b>	†Spiriferida
<b>Sottordine</b>	†Atrypidina
<b>Famiglia:</b>	†Atrypidae
<b>Genere:</b>	† <i>Atrypa</i>
<b>Specie:</b>	† <i>reticularis</i> Linnaeus, 1767



<b>Età/ Distribuzione:</b>	Esclusivi del <b>Paleozoico</b> . Si ritrovano nei sedimenti marini di età compresa tra il Siluriano inferiore (Telychiano) e il <b>Devoniano</b> superiore (tra i 438 e i 360 milioni di anni fa).
<b>Descrizione</b>	Sono caratterizzate da una conchiglia inequivalve biconvessa o piano-convessa, a profilo arrotondato, con la valva brachiale (dorsale) più convessa di quella peduncolare (ventrale), quest'ultima dotata di umbone incurvato. Questi Brachiopodi sono facilmente riconoscibili dall'ornamentazione esterna costituita da numerose e piccole coste radiali che partono dall'umbone e si biforcano anteriormente e da pronunciate linee di accrescimento concentriche.
<b>Provenienza:</b>	Vissero in acque marine superficiali e, in prevalenza, su fondali molli.
<b>Fornitore</b>	
<b>Numero inventario</b>	04
<b>N° campioni</b>	01